

Оценка точности времени выборки



Максимум 3 головы (или 1-2%) с каждого лотка за 30 часов до выборки

Если вышло более 1-2% цыплят, время инкубации слишком продолжительное и в будущем следует закладывать яйцо позднее

Отходы скорлупы – о чем они

Относительно чистая яичная скорлупа означает верное время выборки

Яичная скорлупа со следами мекония означает слишком позднее время выборки



Контрольный список

Что проверить	Действия	Результат, если время выборки
Выводные шкафы за 30 часов до выборки	Сосчитать выведенных цыплят	Максимум 3 головы на лоток
Цыплята при выборке	Проверить влажность спины и шеи	5% цыплят должны иметь немного влажные спину и шею
Появление маховых перьев при выборке	Проверить перья	Перьевые опахала должны быть невидимы
Отходы инкубации при выборке	Проверить наличие следов мекония на поверхности скорлупы	Скорлупа и отходы инкубации должны быть относительно чистыми

После того, как цыплята вышли из яйца и обсохли, дополнительное время, проведенное ими в выводном шкафу, будет иметь негативный эффект

Эффективность расчета времени инкубации

- Когда время инкубации неверно, следует отрегулировать время закладки
- Провести корректировку стадиями по 3 часа (может оказаться необходимым задержка времени закладки вплоть до 15 часов)
- Продолжать расчет верного времени инкубации
- Не менять температуру инкубации

www.aviagen.com

Визуальная оценка цыплят при выборке



При выборке 5% цыплят должны быть влажными в области спины и шеи

Маховые перья цыплят – о чем они говорят

Если становятся очевидно видны перьевые опахала, это означает, что цыплята провели в выводном шкафу слишком долго

